

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kadar kolesterol total mencit kontrol dan mencit uji yang diberi paparan asap rokok tersier.
2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kadar trigliserida mencit kontrol dan mencit uji yang diberi paparan asap rokok tersier.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Akademik

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan saran akademik apabila akan dilakukan penelitian lebih lanjut sebagai berikut:

1. Dilakukan penelitian mengenai paparan asap rokok tersier namun dengan jangka waktu yang lebih lama untuk mengetahui kadar kolesterol total dan trigliserida.
2. Dilakukan penelitian mengenai paparan asap rokok tersier namun dengan banyak paparan yang diberikan untuk mengetahui kadar kolesterol tota dan trigliserida.

5.2.2 Saran Praktis

Perlu penyampaian dan sosialisasi informasi kepada masyarakat tentang pengaruh paparan asap rokok tersier terhadap kadar kolesterol total dan trigliserida karena semakin banyaknya perokok aktif saat ini. Sehingga masyarakat dapat menghindari paparan asap rokok tersier.

