

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

5.1.1 Simpulan Umum

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa lama hari turun demam pada anak dengan demam tifoid yang diberi terapi seftriakson lebih cepat daripada penggunaan kloramfenikol di Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan periode tahun 2014.

5.1.2 Simpulan Khusus

Hasil penelitian ini menyimpulkan karakteristik pasien anak demam tifoid yaitu

1. pasien anak demam tifoid cenderung lebih banyak terjadi pada anak laki-laki dibanding dengan anak perempuan;
2. pasien anak demam tifoid cenderung lebih sering terjadi pada anak usia sekolah usia 5 sampai 10 tahun;
3. demam tifoid cenderung terbanyak pada anak status gizi baik.

5.2. Saran

5.2.1 Saran Akademik

Keterbatasan pada penelitian ini adalah data karakteristik penderita demam tifoid yang tidak lengkap, disarankan penelitian selanjutnya mencari karakteristik yang lebih lengkap termasuk antibiotik yang diberikan sebelumnya dan uji resistensi.

5.2.2 Saran Praktis

Pihak rumah sakit melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pencegahan demam tifoid dengan menghindari faktor risikonya. Dapat dipertimbangkan penggunaan antibiotik seftriakson dalam penanganan pasien demam tifoid rawat inap di rumah sakit, dikarenakan efektivitas seftriakson dalam memengaruhi turun demam lebih cepat dibanding dengan kloramfenikol.

