

ABSTRAK

Prevalensi preeklampsia berat masih tinggi di Indonesia dan menyebabkan banyak kematian ibu. Nyeri kepala merupakan gejala subjektif yang paling sering dialami oleh pasien preeklampsia berat sekitar 50-75%. Eklampsia dan stroke sebagai komplikasi preeklampsia berat mayoritas didahului oleh gejala nyeri kepala yang berat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran derajat nyeri kepala pada pasien preeklampsia berat di RSUD Al-Ihsan dan RSUD Salamun Bandung Periode Maret-Mei Tahun 2016. Penelitian ini bersifat deskriptif. Subjek penelitian adalah pasien preeklampsia berat yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Data penelitian merupakan data primer yang diambil dengan menggunakan kuesioner, profil pasien, dan *Numerical Rating Scale* (NRS). Hasil penelitian dari 46 responden menunjukkan sebagian besar responden mengalami nyeri kepala berat atau sebanyak 65,2%, sebanyak 19,6% mengalami nyeri kepala sedang, 13% mengalami nyeri kepala ringan, dan 2,2% tidak mengalami nyeri kepala. Sebagian besar derajat nyeri kepala pada pasien preeklampsia berat di RSUD Al-Ihsan dan RSAU Salamun Bandung adalah nyeri kepala berat, untuk itu dokter dan pasien harus lebih waspada jika terdapat ibu hamil pada trimester 3 yang mengeluhkan nyeri kepala berat agar preeklampsia berat dapat terdeteksi dini dan terhindar dari komplikasi yang lebih berat seperti eklampsia dan stroke.

Kata kunci: derajat nyeri kepala, ibu hamil trimester 3, preeklampsia berat

ABSTRACT

There are so many cases severe preeclampsia in Indonesia and cause high maternal mortality. Most of the patient of severe preeclampsia often feeling headache about 50-70%. Eclampsia and stroke as the complication of severe preeclampsia often begin with severe headache. The goal of this research is to describe the level of headache in the patient of severe preeclampsia in Al-Ihsan Hospital dan Salamun Hospital Bandung from March to May 2016. This is a descriptive research. The subject of research is the patient of severe preeclampsia which is having the inclusion and exclusion criteria. Data of the research was collected by questionnaire, patient profile, and Numerical Rating Scale (NRS). The result of the research from 46 respondents show that most of them feel severe headache about 65,2%, about 19,6% feel moderate headache, 13% feel mild headache, and 2,2% doesn't feel headache. Most the level of headache in the patient of severe preeclampsia in Al-Ihsan Hospital and Salamun Hospital Bandung is severe headache, that's why the doctor and the pregnant woman have to be aware of severe headache in third trimester in order to early detection of severe preeclampsia and avoid from severe complication such as stroke and eclampsia.

Key words: level of headache, pregnant woman in third trimester, severe preeclampsia