

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

simpulan:

- 1) Pemilihan terapi empirik terbanyak adalah golongan sefalosporin.
- 2) Terdapat rerata lama rawat (*length of stay/LOS*) yang hampir sama pada balita pneumonia yang diberikan terapi empirik golongan penisilin dan sefalosporin.
- 3) Gambaran dari hasil radiologi yang terbanyak adalah corakan bronkovaskular dan infiltrat pada lapang paru serta sebagian besar tidak menunjukkan adanya komplikasi berdasarkan gambaran radiologi.
- 4) Tidak terdapat perbandingan pemilihan terapi empirik golongan penisilin dan sefalosporin pada balita pneumonia berdasarkan lama rawat (*LOS*) dan komplikasi dari gambaran radiologi.

5.2. Saran

5.2.1 Saran Praktis

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan Kecamatan Baleendah diharapkan mampu menekan angka kejadian pneumonia dengan melakukan penyuluhan.
- 2) Perlu dilakukan penyebaran informasi ke seluruh masyarakat dan khususnya kepada para orang tua tentang bahayanya penyakit pneumonia pada anak, serta diperlukan kerja sama yang baik antara para orang tua dan

instansi kesehatan untuk menekan angka kejadian pneumonia di Kecamatan Baleendah.

5.2.2 Saran Akademis

- 1) Peneliti selanjutnya di harapkan dapat mengembangkan penelitian dari semua etiologi dan penatalaksanaan rehabilitasi.
- 2) Penelitian berikutnya diharapkan mengembangkan penelitian dengan metoda *Cohort* sehingga dapat menentukan jumlah data.

