

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di 2 Klinik IMS Bandung yang bertujuan untuk mengetahui hubungan uretritis gonore pada pria dengan minuman beralkohol dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### 5.1.1 Simpulan Umum

1. Jumlah penderita uretritis gonore pada pria peminum minuman beralkohol dari 32 responden, lebih banyak penderita uretritis gonore pada pria peminum sebanyak 18 responden (56,3%).
2. Jenis minuman beralkohol yang paling banyak diminum oleh pasien pria dengan uretritis gonore di 2 Klinik IMS Bandung adalah jenis *Wine* seperti Anggur/Malaga/kasegaran yaitu sebanyak 13 responden (72,2%) dan minuman jenis Bir/Greensand/Heineken sebanyak 11 responden (61,1%).  
Dari data responden yang diperoleh bahwa peminum minuman beralkohol tidak hanya meminum satu jenis minuman beralkohol, tetapi ada juga responden yang minum minuman beralkohol dari jenis lainnya.
3. Sebagian responden menyatakan bahwa melakukan hubungan seksual dalam keadaan mabuk atau minum minuman beralkohol sebelum melakukan hubungan seksual.
4. Hubungan uretritis gonore pada pria dengan minuman beralkohol di 2 Klinik IMS Bandung, ternyata bahwa penderita uretritis gonore pada pria peminum minuman beralkohol dari 32 responden, lebih banyak penderita

urethritis gonore pada pria peminum 18 responden (56,3%) dibandingkan dengan yang bukan peminum alkohol, secara statistik terdapat hubungan yang sangat signifikan (nilai  $p = 0,000$ ).

### 5.1.2 Simpulan Khusus

1. Karakteristik pasien pria dengan gonore di Klinik Mawar Kota Bandung tahun 2019 berdasarkan usia, yaitu pada rentang 20-42 tahun. Dengan usia mayoritas 31-35 tahun sebanyak 11 responden (34,4%) dan usia mayoritas kedua  $\leq 25$  tahun sebanyak 10 responden (31,3%).
2. Frekuensi minum minuman beralkohol dari 18 responden (56,3%) peminum minuman beralkohol terdapat 3 responden (16,7%) termasuk pada kategori sering, sedangkan 15 responden (83,3%) termasuk dalam kategori jarang konsumsi minuman beralkohol, dan dalam 1 minggu terakhir minum minuman beralkohol terdapat 10 responden (55,6%).

## 5.2 Saran

### 5.2.1 Saran Akademik

1. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang berhubungan dengan tingkat kejadian gonore.

### 5.2.2 Saran Praktis

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki minat meneliti mengenai urethritis gonore, yaitu:

1. Perlu ditingkatkan sosialisasi, edukasi, dan pencegahan IMS pada faktor risiko tinggi dan bahaya penyalahgunaan minuman beralkohol.

2. Perlu ditingkatkan sosialisasi, edukasi, dan pencegahan mengenai efek buruk dari penyalahgunaan minuman beralkohol.
3. Perlu adanya kerjasama dengan pihak dinas-dinas terkait.

